

POST-VACUNADOS

Les comparto el protocolo sugerido por el medico francés Dr Jean-Pierre Willem para los que temen los efectos secundarios :

1. Quelación

La clorella, el glutatión o N-acetilcisteína, el malato de magnesio, el ácido alfa lipoico o incluso los aminoácidos que contienen azufre ayudan a quelar los metales pesados.

2. Desintoxicación

Debido a que la mayor parte del proceso de desintoxicación tiene lugar en el hígado, es esencial para apoyar y proteger la función hepática, las membranas de los hepatocitos y su capacidad para producir antioxidantes endógenos.

- SILYDIUM (Zanahoria cultivada , cardo (cirsium arvense), 2 veces 2 cápsulas, Labo Phyt-Inov.

El paso de desintoxicación del hígado consta de 3 fases:

- La fase de biotransformación: transforma las sustancias tóxicas por oxidación en metabolitos intermedios. Esta fase 1 involucra enzimas del citocromo P450 que neutralizan sustancias extrañas.
- La fase de conjugación (o inactivación): permite inactivar metabolitos intermedios tóxicos y hacerlos solubles en agua para poder eliminarlos más fácilmente.

Los principios activos que actúan en este nivel son el brócoli, el glutatión o N-acetilcisteína, la taurina, la metionina, el zinc, el selenio y las vitaminas del grupo B.

- La fase de eliminación: permite evacuar las toxinas inactivadas y solubles por los riñones o por los intestinos a través de la vesícula biliar. Los principios activos que actúan a este nivel son el cardo, el abedul, el potasio y el diente de león.

Una vez que las toxinas se han transformado, hidrofílico, continúan su camino para ser eliminadas ya sea por los riñones o la bilis: j

3. Protección y refuerzo de la tierra

Una vez libre de sustancias tóxicas (metales pesados y xenobióticos), es necesario restablecer el correcto funcionamiento del metabolismo para fortalecer el campo (inmunidad, capacidad antioxidante, vitalidad, sistema nervioso ...) gracias a minerales como el zinc y magnesio y vitaminas del grupo B.

:

Dos enfoques más

En todas mis misiones humanitarias relacionadas con epidemias (Ébola, Chikungunya, Dengue, SARS, MERS ...) he tomado cloruro de magnesio en sobres.

Cloruro de magnesio:

- Inmunoestimulante, ayuda a la formación de anticuerpos;
- Antiinfeccioso, estimula la fagocitosis;
- Restaurador de suelos, bloquea la proliferación de gérmenes;
- Regulador nervioso, normaliza la excitabilidad de los nervios;
- Estimulante general del organismo, aumenta la resistencia y la actividad de las células.
- Restaura el tránsito (estreñimiento)
- Sedante y antidepresivo natural;

Ponga 1 sobre o 2 en una botella de agua. Beber 2 vasos

Tratamiento homeopático durante la vacunación.

- El día anterior: Thuya occidentalis 9CH: una dosis
- El mismo día: Thuya occidentalis 5CH, 3 gránulos tres veces al día e Isoterápicos de la vacuna 5CH, 1 dosis por la mañana.

Inmediatamente después de la vacunación para evitar la fiebre y cualquier inflamación (local o meníngea): Belladonna 30CH, una dosis.

- Silicea 5CH, 3 gránulos dos veces al día.
- El 2º día: Thuya occidentalis 9CH, una dosis por la mañana en ayunas, para evitar que el suelo del niño se vuelva sicótico (bloqueo de la inmunidad e instalación de una enfermedad crónica como el reumatismo), y para evitar sacar a relucir una enfermedad familiar. como eccema y asma.

- Día 3: Thuya occidentalis 15CH por la mañana en ayunas.
- El 4º día: Thuya occidentalis 30CH, una dosis por la mañana en ayunas.
- El 5º día: Isoterapia de la vacuna inyectada en 30CH, 1